Instructions
Please read carefully

Two-part implant systems

Note
Knowledge of the extensive specialized literature is prerequisite for the performance of implantological treatments. Surgical experience in the evaluation of the normal and pathological treatment is mandatory. The prosthetic planning must be performed prior to implantation - also if the surgical situation may cause a later alteration in the planning. These instructions alone are not sufficient for the immediate use of the Implant System.

Description
The Implant System is a system for enossal dental implantations. It consists of implants, surgical and prosthetic instruments as well as abutments. The Implant System is suitable for single and two step implantation methods.

Constituents
The individual active substances can be found on the respective package label or in the brochure concerning the use of the system.

Indications
Upon adequate present bone material in respect of the bone quality, the bone width and the bone height:
- Single tooth replacement for spaces up to a width of incisors and premolars.
- Bridge replacements in dentate, partially dentate and non-dentate jaws
- Anchoring of prostheses via bridge and ball head systems
- Anchoring for orthodontic regulating systems

Side effects
Temporary discomforts
Pain, feeling of tension, swelling, difficulties speaking and inflammation of the gingiva.
Long term disorders
- Oroanthral and oronasal fistula
- Localized or systemic infections
- Crater shaped bone degeneration over the duration of use
- A horizontal and vertical bone degeneration is to be expected, also in proper surgical and prosthetic proceedings - as in all other dental implants. Type and extent of the bone loss is not foreseeable. Functionally caused and inflammatory bone degeneration can accumulate. If implants are placed in the vicinity of certain structures (nerves, maxillary sinus, neighboring teeth etc.), a reparable or irreversible impairment (damage) of these structures can occur. The necessity of an antibiotic prophylaxis should be taken into consideration to prevent infections. Chronic pain has been reported in connection with dental implants. If an osseointegration does not occur, exfoliation of the implant must be expected.

Contraindications
Absolute
- Patients whose systemic condition does not allow an implantation (reference is made to the studies of relevant literature for detailed understanding of this extensive contraindication)
- Prior to, during or after radiation therapy and / or malignant disorders
- Psychological disorders, pain syndrome
- Uncompensated diabetes or other uncompensated systemic disorders
- Current or past therapy with bisphosphonates
- Disorders of the bone metabolism
- Bleeding tendency, immune deficiencies,
- Immediately loaded single tooth implantations
- Allergies to components of the implant system
- Titanium allergy
- Insufficient oral hygiene, lack of compliance

Relative
- Diabetes, bruxism, allergies, pregnancy
- Alchohol and drug abuse, smoking
- Previously radiated bones, therapy with anticoagulants
- Disorders of the temporomandibular joint (on the other hand, numerous disorders of the temporomandibular joint can be treated with an implant therapy)
- Root remnants, periodontitis
- Limited available bone, in particular in the vertical dimension and / or in threatening vicinity of endangered structures (N. Metalis, maxillary sinus etc.).

It must always be considered if a basal implant (i.e. BOI) has less risks.

Interactions
The interactions between titanium surfaces and oral hygiene products containing fluoride has been described in the literature. The patient is to be informed thereof. Due to the different rigidity of crestal implants and natural teeth, a possibly differing influence of the static is to be expected in combined works. Extensive implant prosthetic systems on crestal implants can impair the flexion and mobility of the cranial bones against one another. Pain conditions have been described in this connection.

Use
Diagnosis/explanation
The diagnosis consists of the anamnesis, the clinical examination, the radiological examination with small format x-ray and orthopantomogram as well as CT examinations. It is recommended to have a medical check-up performed by an experienced medical doctor.
Implantations are optional interventions, which require extensive explanations to the patient.
Treatment alternatives and results of the implantations as well as results of a possible failure must be explained. In particular, the importance of oral hygiene and the costs of a following treatment must be explained. For type and extent of the explanation, reference is made to the respective case law.

Approach
Under local anesthesia, preferably under flap formation, an implant bed is established with rotating or displacing instruments. For preparation of an adequate bone bed, the use of the drill and the compliance with a drilling sequence is recommended:

During the preparation of the bone cavity, sufficient cooling of the implant bed is to be ensured (i.e. with cooled (sterile) physiological saline solution).
Never drill above 500-800 rpm. Always use a sharp drill (max. 10 applications). Use intermittent reaming and drilling technique.
The implant is removed from the sterile packaging immediately prior to introduction and stably inserted in the bone bed. It is mandatory that a good primary stability is achieved. Screw implants are screwed in with the help of a ratchet (RAT2), the torque wrench (TW2) or a screwdriver. To minimize frictional warmth, it must be screwed in slowly and without great pressure. Depending on the available bone and the intended planning, the implants are inserted with the neck portion (polished shaft) extending from the bone or completely covered by the bone. If a removable dental prosthesis will be worn over the implants covered with muscous membrane during the healing period, the implant must be inserted in the bone in order to avoid exposure during the healing phase as well to prevent chewing pressure on the implant.
In the selection of the implant, the height and width as well as the quality of the present bone must be taken into consideration. It is recommended not to remove too much soft bone during the drilling, but rather to compress the bone to the side with displacing osteotomes.
Afterwards, the implant is either closed with the surgical screw on the mouth side (two step method), or a healing screw is inserted tight (mucosa height) is screwed in (single step method). If indicated, an adequate wound closure and local radiological control follow. During the healing phase (3-6 months are recommended depending on bone quality), the surgical site is to be shielded in the oral cavity periods. In incomplete healing of the mucous membrane and / or premature mucous membrane penetration, it is recommended to reopen the surgical screw with a healing cap. As long as the static of the total construction as well as the situation during the insertion allows, implants can also be loaded directly after the insertion. This is decided by the treating dentist. In case of doubt, a healing period of 3-5 months without loading is to be complied with - depending on the quality of the bone. After completion of the healing phase, a radiological and clinical control is performed. Abutments from the Implant System are available for the prosthetic treatment. The table below provides information concerning the fitting code. For further information please refer to the respective brochure concerning the use of the system.

Note
- After the implantation, the type of the used implant and the change number must be noted in the patient file in writing.
- Implants may only be used in the period prior to expiration.
- Implants must be stored dry and sealed. The seal is to be opened immediately prior to introduction. All contact with body fluids, immunodefilte, ation of the implant is to be avoided. The enossal part of the implant may not be touched.
- Upon accidental swallowing of implants, abutments or accessories, the remainder of the object is to be secured (x-ray or similar) and the necessary medical measures taken.
- The healing of the implant must be controlled regularly (i.e. radiological).
- To prevent bone loss, implants which are not osseointegrated or which are infected must be removed. The time of removal is determined by the dentist.

Shelf life/storage of the implants
The shelf life is 5 or 7 years after sterilization; see expiration date on the package.
Store tightly closed and dry.

Comment
Only originally sealed implants are sterile during the shelf life period. If implants are reoitilized by the final consumer, no responsibility is assumed - independent of the method of sterilization. Sterile products are marked with STERILE. The expiration date is noted with the hour glass symbol. The LOT states the charge number. Implants may only be used once.

Dr. Ihde Dental reserves the right to change the design of the product and components or the packaging thereof, to adapt instructions of use as well as to newly agree on prices or delivery conditions. The liability is limited to the replacement of the defective product. Further claims of all types are excluded.

Legend

	Read instructions
	Expiration date
STERILE R	(Gamma) -sterilized
	Only use once
	Do not resterilize
	non sterile
STERILE	Store tightly keep closed
LOT	Charge number
-5 °C / 35 °C	Temperature range from -5 °C to 35 °C
	Store in dry place
	Do not use if packing is damaged
	Manufacturer

CE 0029

996-2TEILIG-03

Revision issued 2012-04

In case that implants would be reprocessed (cleaned, resterilized) infections could occur, because no established procedures for reprocessing are available.

When processing resterilizable medical devices, the rules of the RKI-Guideline and the European standard EN ISO 17664 are relevant and must be obeyed. Guidelines regarding the processing of our instruments are available in the brochure accompanying our instruments. At the same time these guidelines are displayed on the website www.implant.com .

Dr. Ihde Dental AG
Dorfplatz 11
CH-8737 Gommiswald/SG
Tel. +41 (0)55 293 23 23
Fax +41 (0)55 290 23 00
contact@implant.com
www.implant.com

Vertrieb / Distributed by / Distributeur / Distribuidor / Раздатчик

SIMPLADENT GmbH
Erfurter Strasse 19
DE-88386 Etching
Tel. +49 (0)89 3197611-0
Fax +49 (0)89 3197611-33
info@ihde-dental.de
www.implant.com

SIMPLADENT GmbH
CH-8737 Gommiswald
SWITZERLAND
www.simpladent-implants.com

Gebrauchsanweisung
Bitte sorgfältig lesen

Zweiteilige Implantatsysteme

Hinweis
Die Kenntnis der einschlägigen Fachliteratur ist Voraussetzung für die Durchführung von implantologischen Behandlungen. Chirurgische Erfahrungen in der Beurteilung des normalen und pathologischen Behandlungsverlaufs sind zwingend erforderlich.
Die prothetische Planung muss vor der Implantation durchgeführt werden – auch wenn die chirurgische Situation später eine Änderung der Planung erforderlich machen kann. Diese Gebrauchsinformation reicht zur sofortigen Anwendung des Implantatsystems allein nicht aus.

Beschreibung
Das Implantatsystem ist ein System für enossale zahnärztliche Implantationen. Es besteht aus Implantaten, chirurgischen und prothetischen Instrumenten sowie Abutments. Das Implantatsystem ist geeignet für einstufige und zweistufige Implantationsverfahren.

Wesentliche Bestandteile
Die jeweiligen Werkstoffe entnehmen Sie dem jeweiligen Verpackungslabel bzw. der jeweiligen Systemanwendungsbroschüre.

Indikationen
Bei vorhandenem ausbaufatem Knochenangebot hinsichtlich der Knochenqualität, der Knochenbreite und der Knochenhöhe:
- Einzelzahnersatz für Lücken bis zur Breite von Incisiven und Praemolaren.
- Brückenersatz in bezahnten, teilbezahnten und unbezahnten Kiefern und Gebissen
- Verankerung von Prothesen über Steg- und Knopfankersysteme
- Verankerung für orthodontische Regulierungssysteme

Nebenwirkungen
Vorübergehende Beschwerden
Schmerzen, Spannungsgefühl, Schwellungen, Sprechschwierigkeiten und Entzündungen der Gingiva.
Länger anhaltende Beschwerden
- Oroanthrale und oronasale Fisteln
- Lokalisierte oder systemische Infektionen
- Kraterförmiger Knochenabbau über Gebrauchsperiode
- Auch bei einem ordnungsgemäßem chirurgischen und prothetischem Vorgehen ist - wie auch bei allen sonstigen zahnärztlichen Implantaten - mit horizontalem und vertikalem Knochenabbau zu rechnen. Art und Umfang des Knochenverlusts sind nicht vorhersehbar. Funktionell bedingter und entzündlicher Knochenabbau können kumulieren. Kommen Implantate in die Nähe von besonderen Strukturen zu liegen (Nerv, Kieferhöhle, Nachbarzähne u. a.), kann es zu einer reversiblen oder irreversiblen Beeinträchtigung (Schädigung) dieser Strukturen kommen. Zum Schutz vor Infektionen ist die Notwendigkeit einer antibiotischen Prophylaxe abzuwägen. Chronische Schmerzen in Verbindung mit Dentalimplantaten wurden beschrieben. Kommt es nicht zur Osseointegration, ist mit einer Exfoliation des Implantats zu rechnen.

Kontraindikationen
Absolute
- Patienten, deren systemischer Zustand eine Implantation nicht zulässt (zum besseren Verständnis dieser umfangreichen Kontraindikation wird auf das Studium der einschlägigen Fachliteratur verwiesen)
- Vor, während oder nach Bestrahlungstherapie und /oder malignen Erkrankungen
- Psychische Störungen, Schmerzsyndrome
- Unkompensierter Diabetes oder andere unkompensierte systemische Erkrankungen
- Laufende oder frühere Therapie mit Bisphosphonaten
- Erkrankungen des Knochenstoffwechsels
- Blutungsneigung, Immundefekte,
- Sofortbelastete Einzelzahnimplantationen
- Allergien gegen Bestandteile des Implantatsystems
- Titanallergie
- Mangelhafte Mundhygiene, mangelnde Compliance

Relative
- Diabetes, Bruxismus, Allergien, Schwangerschaft
- Alkohol- und Drogenmissbrauch, Rauchen
- Vorbestrahlter Knochen, Therapie mit Anticoagulantien
- Kiefergelenkserkrankungen (andererseits können zahlreiche Kiefergelenkserkrankungen mittels einer Implantat-Therapie behandelt werden)
- Wurzelreste, Paradontitis
- Geringes Knochenangebot: Insbesondere in vertikaler Dimension und /oder bei drohender Nähe von gefährdeten Strukturen (N. Metalis, Kieferhöhle u.a.),
- Es ist stets zu prüfen, ob nicht ein basales Implantat (z.B. BOI) risikoärmer anzuwenden ist.

Wechselwirkungen
In der Literatur wurden Wechselwirkungen zwischen Titanoberflächen und fluoridhaltigen Mundpflegepräparaten beschrieben. Hieraul ist der Patient hinzuweisen. Aufgrund der unterschiedlichen Rigidität von crestalen Implantaten und natürlichen Zähnen ist bei kombinierten Arbeiten mit einer stark unterschiedlichen Beeinflussung der Statik zu rechnen. Umfangreiche Implantat-Prothetik-Systeme auf crestalen Implantaten können die Flexion und Beweglichkeit der Schädeknochen gegeneinander einschränken. In diesem Zusammenhang wurden Schmerzzustände beschrieben.

Anwendung
Diagnostik/Aufklärung
Die Diagnostik setzt sich zusammen aus der Anamnese, der klinischen Untersuchung, der Röntgenuntersuchung mittels Kleinbild-Röntgen und Orthopantomogram sowie ggf. CT-Untersuchung. Es wird empfohlen, ein medizinisches Check-Up durchgeführt werden – auch wenn die chirurgische Situation später eine Änderung der Planung erforderlich machen kann. Diese Gebrauchsinformation reicht zur sofortigen Anwendung des Implantatsystems allein nicht aus.

Vorgehensweise
In Lokalanästhesie wird, vorzugsweise unter Lappenbildung, ein Implantatbett mit rotierenden oder verdrängenden Instrumenten geschaffen. Zur Präparation eines adäquaten Knochenbettes wird den die Verwendung der Bohrer und die Einhaltung einer Bohr-sequenz empfohlen:

Ein entsprechender zusätzlicher Abstand zu gefährdeten Strukturen muss eingehalten werden. Detaillierte Strukturangaben sind der Fachliteratur zu entnehmen.

Während der Präparation der Knochenkavität ist auf reichliche Kühlung des Implantatbetts (z.B. mit gekühlter (steriler) physiologischer Kochsalzlösung) zu achten.
Keinesfalls mit mehr als 500-800 Upm bohren. Stets scharfe Drills verwenden (max. 10 Anwendungen). Intermittierende Fräs- und Bohrtechnik anwenden.
Das Implantat wird erst unmittelbar vor dem Einbringen der sterilen Verpackung entnommen und in das Knochenbett stabil inseriert. Es ist zwingend eine gute Primärstabilität erreicht werden. Schraubimplantate werden mit Hilfe einer Ratsche (RAT2), der Torque-wrench (TW2) oder einer Schraubendrehers eingeschraubt. Um Reibungswärme zu minimieren, muss langsam und ohne großen Druck eingedreht werden. Je nach vorhandenem Knochenangebot und nach der vorgesehenen Planung werden die Implantate mit dem Halsteil (polierter Schaft) in gleicher Höhe mit dem umgebenden Knochen oder bis unter den Schleimhaut bedeckten Implantaten. Soll herausnehmbarer prothetischer Ersatz über Implantate mit Schleimhaut bedeckten Implantaten getragen wird, muss das Implantat in den Knochen inseriert werden, um ein Freiliegen während der Einheilphase sowie Kaudruck auf das Implantat zu vermeiden.
Bei der Wahl des Implantats muss der vorhandene Knochen in seiner Höhe und Breite sowie in seiner Qualität berücksichtigt werden. Es empfiehlt sich, in weichen Knochen nicht zu kurzen Bohren durch eine Bohrung zu entfernen, sondern den Knochen eher verdrängend mit Osteotomen seitlich zu komprimieren.
Anschließend wird das Implantat entweder mit der chirurgischen Schraube mundseitig verschlossen (zweistufiges Verfahren), oder es wird eine Einheilschraube in adäquater Länge (Mukosahöhe) aufgeschraubt (einstufiges Verfahren). Gegebenenfalls erfolgen ein adäquater Wundverschluss und eine Röntgenkontrolle. Während der Einheilphase (je nach Knochenqualität werden 3-6 Monate empfohlen) ist der Operationsfluss in regelmässigen Abständen zu kontrollieren. Bei unvollständiger Schleimhautheilung und/oder vorzeitiger Schleimhautpenetration) wird empfohlen, die chirurgische Schraube durch eine Einheilkappe zu ersetzen. Sofern die Statik der Gesamtkonstruktion sowie die Situation bei Insertion es erlauben, können Implantate auch unmittelbar nach der Insertion belastet werden. Hierüber entscheidet der behandelnde Zahnarzt. Im Zweifelsfall soll eine Einheilzeit ohne Belastung von 3-5 Monaten – je nach der vorliegenden Knochenqualität - eingehalten werden. Nach Abschluss der Einheilphase erfolgt eine röntgenologische und klinische Kontrolle.
Für die prothetische Versorgung stehen Abutments des Implantatsystems zur Verfügung. Über die passenden Teile gibt die unten aufgeführte Tabelle Auskunft.
Für weitere Informationen verwenden Sie bitte die entsprechende Systemanwendungsbroschüre.

Hinweise
- Nach der Implantation muss schriftlich die Art des verwendeten Implantats und die Chargennummer in der Patientenakte festgehalten werden.
- Implantate dürfen nur innerhalb der Periode der Haltbarkeit verwendet werden.
- Implantate müssen trocken und verschlossen gelagert werden. Der Verschluss ist erst unmittelbar vor dem Einbringen zu öffnen. Jegliche Berührung mit Fremdsubstanzen vor der Insertion des Implantates zu vermeiden. Der enossale Teil des Implantats darf nicht berührt werden.
- Bei versehentlichem Verschlucken von Implantaten, Abutments oder Zubehör sind der Verbleib des Gegenstands sicherzustellen (Röntgen, u. a.) und die erforderlichen medizinischen Maßnahmen vorzunehmen.
- Die Einheilung des Implantats muss regelmäßig (z.B. röntgenologisch) kontrolliert werden.
- Zur Vermeidung von Knochenverlusten müssen nicht osseointegrierte oder infizierte Implantate rechtzeitig entfernt werden. Den Zeitpunkt der Entfernung bestimmt der Zahnarzt.

Haltbarkeit/Lagerung der Implantate
Die Haltbarkeit beträgt 5 oder 7 Jahre ab Sterilisation; siehe Verfallsdatum auf der Packung.
Gut verschlossen und trocken lagern.

Bemerkung
Nur original verschlossene Implantate sind während der Periode der Haltbarkeit steril. Sofern Implantate durch den Endverbraucher resterilisiert werden, wird hierfür – unabhängig von der Sterilisationsmethode – die Verantwortung abgelehnt. Sterilprodukte tragen das Zeichen STERILE. Das Verfallsdatum ist mit dem Sanduhrsymbol angegeben. Die Angabe LOT bezeichnet die Chargennummer. Implantate dürfen nur einmal verwendet werden.

Dr. Ihde Dental behält sich vor, das Design der Produkte und Bauteile oder deren Verpackung zu verändern, Anwendungshinweise anzupassen sowie Preise oder Lieferbedingungen neu zu vereinbaren. Die Haftung beschränkt sich auf den Ersatz des fehlerhaften Produkts. Weitergehende Ansprüche jeglicher Art sind ausgeschlossen.

Zeichenerklärungen

	Gebrauchsanweisung lesen
	Verfallsdatum
STERILE R	(Gamma) -sterilisiert
	Nur einmal verwenden
	Nicht erneut sterilisieren
STERILE	unsteril
LOT	Chargennummer
	Gut verschlossen halten
-5 °C / 35 °C	Temperatur von -5 °C bis 35 °C
	Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden
	Hersteller

CE 0029

996-2TEILIG-03

Letzte Überarbeitung 2012-04

Bei erneuter Aufbereitung von Implantaten besteht die Gefahr der Entstehung von Infektionen, da keine validierten Verfahren zur Aufbereitung existieren.

Bei der Wiederaufbereitung von resterilisierbaren rotierenden Instrumenten sind die Vorgaben der RKI-Richtlinie und der Norm EN ISO 17664 einzuhalten. Hinweise betreffend unsere Instrumente finden Sie auf dem Merkblatt, welchen den Instrumenten beigelegt ist. Dieses Merkblatt kann auf der site www.implant.com eingesehen werden.

Dr. Ihde Dental AG
Dorfplatz 11
CH-8737 Gommiswald/SG
Tel. +41 (0)55 293 23 23
Fax +41 (0)55 290 23 00
contact@implant.com
www.implant.com

Vertrieb / Distributed by / Distributeur / Distribuidor / Раздатчик

Dr. Ihde Dental GmbH
Erfurter Strasse 19
DE-88386 Etching
Tel. +49 (0)89 3197611-0
Fax +49 (0)89 3197611-33
info@ihde-dental.de
www.implant.com

onewaybiomed GmbH
CH-8737 Gommiswald
SWITZERLAND
www.onewaybiomed.com

SIMPLADENT GmbH
CH-8737 Gommiswald
SWITZERLAND
www.simpladent-implants.com

Инструкция по применению
Для внимательного изучения

Двухэтапный имплантат

Указание
Знание соответствующей специальной литературы является предпосылкой для проведения имплантологических процедур. Обязательно необходимо наличие хирургического опыта в оценке нормального или патологического хода лечения. Перед имплантацией необходимо провести планирование протезирования– даже если в дальнейшем хирургическая ситуация потребует внесения изменений в ранее составленный план. Только этой инструкции по применению-недостаточно для немедленного использования системы имплантантов .

Описание
Система имплантантов предназначена для эндосальных стоматологических имплантаций. Она состоит из имплантантов, хирургических и протезных инструментов, а также абатментов. Система имплантантов подходит для одно- и двухэтапного методов имплантации.

Существенные составляющие
Материалы берите из соответствующих отмеченных упаковок согласно маркировку по применению системы.

Показания
При соответствующих костных характеристиках (плотность, ширина и высота кости):
- Единичные зубные протезы на промежутках от резцов до премоляров
- Мостовидный протеза челюсти, как полностью, так и частично лишенных зубов
- Жесткое крепление протезов посредством балок и систем шаровидной фиксации
- Крепление для ортодонтических систем регулировки

Побочные эффекты
Временные:
Боли, чувство напряжения, припухлости, затруднения речи и воспаления.
Длительные:
- Свищи в ротовой и носовой полостях
- Локальные или системные инфекции
- Точечные изломы кости в период использования
- Даже при правильном хирургическом и протезной методике– как в прочем это касается и других стоматологических имплантатов – возможно возникновение горизонтальных и вертикальных костных разрушений. Невозможно заранее предугадать тип и объем костной конструкции. Функционально обусловленное и воспалительное костные разрушения могут сочетаться. Если имплантанты расположены вблизи от структур, требующих особой сохранности (нервы, верхнечелюстную пазуха, соседние зубы и пр.), это может привесть к ограничению или необратимому повреждению этих структур. Для защиты от инфекций, возможно, есть необходимость профилактического приема антибиотиков. Длительные боли, связанные со стоматологическими имплантантами, были описаны. Если не осуществляется остеоинтеграция, то возможна эксфолиация имплантанта.

Противопоказания
Абсолютные:
- Пациенты, системное состояние которых не позволяет проведение имплантации (для более детального понимания этим обширных противопоказаний необходимо изучить соответствующую специальную литературу)
- Декомпенсированный сахарный диабет или другие декомпенсированные системные заболевания
- Недостаточная гигиена ротовой полости, недостаточное соблюдение пациентом правил лечения
- Болезни крови, иммунодефициты
- Аллергия на составляющие системы имплантантов
- Аллергия на титан
- Текущая или предшествовавшая терапия с использованием бифосфатов
- Заболевания, связанные с нарушением обмена веществ в костной ткани.

Относительные:
- Диабет
- Брукизм
- Аллергии
- Алкогольная и наркотическая зависимость, курение.
- Терапия с использованием антикоагулянтов
- Беременность
- Заболевания нижнечелюстного сустава (с другой стороны многие заболевания нижнечелюстного сустава поддаются имплантологической терапии могут быть излечены)
- Остатки корней, пародонтит
- Склонность к кровотечениям
- После лучевой терапии- вначале с использованием имплантантов должно быть согласовано с терапевтами, проводящими лучевую терапию.
- Заболевания, сказанные с нарушением обмена веществ.
- Перед, во время или после лучевой терапии и/или злокачественных заболеваний
- Психические заболевания
- Болевые синдромы
- Недостаточное количество костной ткани: особенно в вертикальном измерении и/или непосредственно вблизи от структур, подвергающихся заболеванию (верхнечелюстной пазухи и т.д.) Необходимо проверить, нельзя ли использовать для большей безопасности базально остеоинтегрированный имплантант (напр. BOI)

Взаимодействия
В литературе описывались взаимодействия между титановыми поверхностями и фторсодержащими препаратами по уходу за ротовой полостью. Пациенту необходимо об этом сообщить. По причине отличающейся подвижности кристальных имплантатов и естественных зубов при комбинированных работах можно ожидать на совершенно разные статические воздействия. Обширные имплантационно-протезные системы на кристальных имплантантах могут ограничивать гибкость и подвижность костей черепа относительно друг друга. В связи с этим были описаны болевенные состояния.

Применение
Диагностика/Объяснение
Диагноз ставится на основе анамнеза, клинического обследования, рентгенологического обследования с использованием рентгеновских снимков малого формата и ортопантомограммы, а также при необходимости СТ-обследования. Рекомендуется доверять проведение полного медицинского обследования квалифицированным медиком общей направленности.
Имплантации представляют собой вмешательства, об особенностях которых нужно полностью информировать пациента. Требуются разъяснения по возможностям альтернативного лечения и последствиям имплантаций, а также последствиям при возможной неудаче. Особенно нужно обратить внимание на важность гигиены ротовой полости и на расходы на последующее лечение. О том, каких объемах и в каком объеме нужно провести разъяснительную работу, говорится в соответствующих юридических документах.

Метод
Под местной анестезией создается ложе для имплантанта с использованием вращающихся и вытесняющих инструментов. Для препарирования костного ложа имплантанта рекомендовано использование сверл и соблюдение следующей последовательности в использовании сверл:

Следует держаться на соответствующем дополнительном расстоянии от структур, требующих бережного отношения. Детальную информацию по этому поводу вы можете взять в нашей подробных брошюрах, посвященных нашей продукции.

Во время препарирования костного ложа следует удалять внимание необходимости основательного охлаждения ложа имплантанта и (или) (напр. с помощью охлажденного (стерильного) физиологического раствора).
Число оборотов при сверлении ни в коем случае не должно превышать 500-800 об/мин. Постоянно следует использовать только острые сверл (макс. 10 применений). Использовать интермиттирующую технику для фрезерования и сверления.
Имплантант извлекается из стерильной упаковки непосредственно перед введением и стабильно устанавливается в костное ложе. Обязательно следует создать надежную первую установку. Винтовые имплантаты вкручиваются с помощью храпового механизма (RAT 2), гаечного ключа с ограничением по крутящему моменту (TW 2) или отвертки. Чтобы уменьшить нагревание от трения, процесс вкручивания нужно осуществлять медленно и без большого давления. В зависимости от имеющегося количества костной ткани и разработанного плана для проведения имплантации имплантанты устанавливаются погруженными в костное углубление и полностью при этом закрываются костью, или же шейка, представляющая собой отполированный участок, выступает из кости после введения имплантата. Поскольку в период заживления над имплантантом, прикрытым слизистой оболочкой, носят съемный зубной протез, то имплантант следует полностью погружать в кость с целью избежания его обнажения в период заживления, а также давления на имплантант при жевании.
При выборе имплантанта следует учитывать ширину, высоту и плотность имеющейся кости. Рекомендуется, если кость мягкая, избегать ее чрезмерного сверления, а скорее ужать ее аттесняющими движениями в сторону путем использования остеотомов.
После этого имплантант либозакрывается с помощью хирургического болта-заглушки со стороны ротовой полости (двухэтапный метод), либо накручивается ФДМ соответствующей длины (в зависимости от толщины слизистой оболочки) (одноэтапный метод). При необходимости далее производится ушивание раны и регистр-контроль. В период заживления (в зависимости от плотности кости рекомендованы 3-6 месяцев) регулярно по процедствии определенных временных интервалов необходимо осуществлять контроль состояния после проведенной операции. В случае неполного зажившения слизистой оболочки и/ или преждевременного пенетрации рекомендуется заменить хирургический болт-заглушку на колпачок для зажившения(ФДМ). Если статика всей конструкции и ситуация при установке это позволяют, имплантанты могут нагружаться прямо непосредственно после введения. Здесь решение принимает лечащий врач. Если есть сомнения, то следует выдержать период в зажившения 3-5 месяцев (в зависимости от плотности кости), не провая нагрузку имплантанта. По прошествии этого периода, отводящегося на зажившение, производится рентгенологический и клинический контроль.
Для протезного обслуживания используются абатменты системы имплантантов. Нижеприведенная таблица содержит информацию о подходящих деталях. Для получения более подробной информации, смотрите руководство по применению системы.

Инструкции
- После имплантации в карточке пациента должны быть описаны вид использованных имплантантов и номер партии.
- Имплантанты должны использоваться с учетом их срока годности
- Имплантанты должны хранится в сухих помещениях в закрытой упаковке. Открывается должны непосредственно перед из введением. Следует избегать любого соприкосновения имплантантов с инородными веществами до их использования. Нельзя прикасаться к эндоссальной части имплантанта.
- В случае случайного проглатывания имплантантов, абатментов или прочих принадлежностей следует установить местонахождение предмета (с помощью рентгена и пр.) и принять необходимые медицинские меры.
- Зажившение имплантанта следует регулярно контролировать (напр. с помощью рентгена).

Условные обозначения

	Необходимо читать инструкцию
	Срок годности
STERILE R	Стерилизовано гамма-лучами
	Только для одноразового применения
	Повторно не стерилизовать
STERILE	Нестерил
LOT	Номер серии
	Хранить в сухом месте магазина
-5 °C / 35 °C	Хранить в закрытой упаковке провести
	Температура из -5 °C к 35 °C
	Не использовать, если упаковка повреждена
	Производитель

CE 0029

996-2TEILIG-03

ПЕТЕСМОТТ ПТОВЕДЕН 2012-04

В случае, если имплантаты бышут подвергнуты повторной обработке (очищение, повторная стерилизация), может возникнуть инфекция, т.к. отсутствуют утвержденные методы для этих мероприятий.

При обработке рестерилизуемых медицинских устройств, правила RKI-руководства и европейского стандарта EN ISO важны и их необходимо подчинятся. Руководящие указания по обработке наших инструментов находятся в сопровождающей их брошюре. В то же самое время эти руководящие указания разположены на нашем веб-сайте.

Dr. Ihde Dental AG
Dorfplatz 11
CH-8737 Gommiswald/SG
Tel. +41 (0)55 293 23 23
Fax +41 (0)55 290 23 00
contact@implant.com
www.implant.com

Vertrieb / Distributed by / Distributeur / Distribuidor / Раздатчик

onewaybiomed GmbH
CH-8737 Gommiswald
SWITZERLAND
www.onewaybiomed.com

SIMPLADENT GmbH
CH-8737 Gommiswald
SWITZERLAND
www.simpladent-implants.com

Mode d'emploi
A lire attentivement

Systèmes d'implants à deux éléments

Indication
L'exécution de traitements implantologiques présuppose une connaissance impérative de la littérature spécialisée en la matière. Il est obligatoire de disposer d'une expérience chirurgicale de l'évaluation du déroulement du traitement normal et pathologique.
La planification prothétique doit précéder l'implantation – même lorsque la situation chirurgicale est susceptible d'exiger une modification ultérieure de la planification. Ces renseignements relatifs à l'emploi du système ne suffisent pas à eux seuls à permettre une utilisation immédiate du système d'implants.

Description
Le système d'implants est un système d'implantation dentaire endo-osseux. Il se compose d'implants, d'instruments chirurgicaux et prothétiques et de piliers implantaires. Le système d'implants convient aux procédés d'implantations en un et deux temps.

Composants essentiels
Se reporter à l'étiquetage sur l'emballage ou à la brochure d'utilisation du système pour en connaître les composants.

Indications
Quand le volume osseux disponible est adéquat en termes de qualité, de largeur et de hauteur d'os:
- Remplacement de dents individuelles pour des espaces pouvant atteindre la largeur d'incisives et de prémolaires.
- Remplacement de bridge dans les mâchoires dentées, partiellement dentées et édentées.
- Ancrage de prothèses par des systèmes d'ancrage par liteau et par bouton
- Ancrage pour systèmes de régulation orthodontique

Effets secondaires
Gênes passagères
Douleurs, sensation de tension, enflures, difficultés à parler et inflammations de la gencive.
Gênes à long terme
- Fistules bucco-sinusiennes et bucco-nasales
- Infections localisées ou générales
- Résorption osseuse en forme de cratère au cours de la période d'utilisation
- Même lorsque la procédure chirurgicale et prothétique se déroule correctement, un phénomène de résorption osseuse est à prévoir dans le sens horizontal et vertical, comme c'est le cas pour tous les implants dentaires. Le type et l'étendue de la perte osseuse restent impossibles à déterminer à l'avance. Des phénomènes de résorption osseuse fonctionnement et inflammatoire peuvent se cumuler. La pose d'implants à proximité de structures spécifiques (nerf, sinus maxillaire, dents voisines etc.) peut affecter ces dernières de manière réversible ou irréversible (dégradation). Dans un souci de protection contre les infections, il convient d'évaluer la nécessité d'un traitement préventif par antibiotiques. Des douleurs chroniques liées aux implants dentaires ont fait l'objet de descriptions. En l'absence d'ostéo-intégration, prévoir l'exfoliation de l'implant.

Contre-indications
Absolues
- Patients dont l'état de santé général s'oppose à l'implantation (renvoi est fait à l'étude de la littérature spécialisée en la matière pour une explication détaillée de cette contre-indication)
- Avant, pendant ou après une radiothérapie et / ou des affections malignes
- Troubles psychiques, syndrome douloureux
- Diabète décompensé ou autres affections systémiques décompensées
- Thérapie de cours ou antérieure impliquant des bisphosphonates
- Troubles du métabolisme osseux
- Diathèse hémorragique, immunodéficience,
- Implantation de dents individuelles devant être immédiatement soumises à des charges
- Allergies à des composants du système d'implants
- Allergie au titane
- Hygiène bucco-dentaire insuffisante, défaut de conformité

Relatives
- Diabète, bruxisme, allergie, grossesse
- Consommation excessive d'alcool et de drogue, tabagisme
- Os prétraités par rayonnement, thérapie aux anticoagulants
- Affections de l'articulation temporo-mandibulaire (d'un autre côté, une thérapie par implant peut soigner de nombreuses affections de l'articulation temporo-jaw)
- Restes de racine, parodontite
- Faible volume osseux disponible : en particulier dans le sens vertical et / ou à proximité des structures menacées (N. Metalis, sinus maxillaire etc.). Il convient de toujours s'assurer qu'il n'est pas moins risqué d'opter pour un implant basal (ex. BOI).

Interactions
Les interactions entre les surfaces en titane et les produits d'hygiène bucco-dentaire contenant du fluor ont été décrits dans la littérature spécialisée. Le patient doit en être informé. Compte tenu de la différence de rigidité entre les implants crestaux et les dents naturelles, l'impact de la statique peut grandement varier en cas de travaux combinés. Les systèmes prothétiques complets d'implantation sur implants crestaux peuvent nuire à la flexion et à la mobilité des os crâniens. Les états douloureux correspondants ont été décrits.

Application
Diagnostic/explication
Le diagnostic se compose de l'anamnèse, de l'examen clinique, de l'examen radiologique au moyen d'un petit appareil de radiologie et d'un orthopantomogramme et, le cas échéant, d'un examen par CT. Il est recommandé de faire procéder à un check-up médical par un médecin généraliste expérimenté.
Les implantations sont des interventions électives impliquant que le patient soit parfaitement informé. Il doit être mis au courant des traitements alternatifs et des conséquences des implantations ainsi que des répercussions d'un éventuel échec. En particulier, il faut attirer son attention sur l'importance d'une bonne hygiène bucco-dentaire et sur les coûts d'un traitement ultérieur. Se reporter à la jurisprudence légale en la matière pour en savoir plus sur le type et l'étendue des informations à fournir.

Procédure
Sous anesthésie locale, de préférence avec formation d'un lambeau pédiculé, constituer un lit d'implantation au moyen d'instruments rotatifs ou de déplacement. Il est recommandé d'utiliser la fraise et d'observer une séquence de traisage afin de préparer un lit osseux adéquat:

Respecter impérativement une distance supplémentaire adéquate avec les structures menacées. Se reporter aux brochures détaillées sur les produits afin de connaître les schémas complets sur ce point. Lors de la préparation de la cavité osseuse, veiller à ce que le lit d'implantation soit suffisamment refroidi (ex.: au moyen d'une solution saline physiologique refroidie (stérile)). Ne jamais percer à plus de 500-800 tpm. Toujours utiliser des fraises affûtées (10 utilisations max.). Appliquer une technique de fraisage et de forage par intermittence. Ne retirer l'implant de son emballage stérile qu'au dernier mo

Manuale per l'utente
Si prega di leggere attentamente

Sistema implantare bipezzo

Avvertenza
La conoscenza della letteratura specializzata del settore costituisce la premessa fondamentale per un corretto esecuzione delle trattamenti implantari. Risultano pertanto estremamente necessarie esperienze chirurgiche per la valutazione del normale decorso del trattamento e di quello patologico. Il progetto protesico deve essere effettuato prima dell'impianto, anche laddove la situazione chirurgica renda necessaria, in seguito, una modifica del progetto. Il presente manuale per l'utente non è sufficiente, da solo, all'utilizzo immediato del sistema impiantare.

Descrizione
il sistema impiantare, è un sistema per impianto-logia adontoiatrica ennosale. Esso è costituito da impianti, strumenti chirurgici e protesici e abutment. il sistema impiantare, è idoneo per interventi di impiantologia monofase o bifase.

Componenti essenziali
È possibile individuare i singoli materiali dalle etichette delle relative confezioni, o dai singoli manuali di istruzioni per l'impiego del sistema.

Indicazioni
Se è disponibile una quantità adeguata di tessuto osseo, a seconda della qualità, della larghezza e dell'altezza dell'osso:
- Protesi singolare per gli spazi dentali fino alla larghezza degli incisivi e dei premolari.
- Protesi a ponte in arcate e morsi dentati, parzialmente edentuli o edentuli
- Ancoraggio di protesi a barra e a bottone
- Ancoraggio di sistemi ortodontici di regolazione

Effetti collaterali
Disturbi di natura passeggera
Dolore, sensazione di tensione, gonfiori, difficoltà nel parlare e infiammazioni della gengiva
Disturbi persistenti
- Fistole persistenti e oronasali
- Infezioni localizzate o sistemiche
- Degradazione ossea crateriforme durante il periodo di impiego
- Anche in caso di intervento chirurgico e protesico corretto, occorre considerare una degradazione ossea orizzontale e verticale, causa evviene per tutti gli atti tipi di impianti ortodontici. Non è possibile prevedere il tipo e l'entità della perdita ossea. Può verificarsi inoltre un occumento della degradazione ossea infiammatorio e commisurato alla fundamentità. Qualora l'impianti vengano a trovarsi in prossimità di strutture particolari (nervi, seno mascellare, denti adiacenti ecc.) potrebbe essere provocato un danno reversibile o irreversibile a tali strutture. È necessario valutare la necessità di una profilassi antibiotica a protezione delle impianti. Sono stati descritti casi di edema cronico in relazione agli impianti dentali. Qualora non si verifichi la osseointegrazione, tenere in considerazione la possibilità di un'esfoliazione dell'impianto.

Controindicazioni
Assolute
- Pazienti, le cui condizioni sistemiche non consentano l'applicazione di un impianto (per una comprensione dettagliata delle molteplici controindicazioni, si rimanda allo studio della letteratura specializzata del settore)
- Prima, durante o dopo una terapia radiante e/o patologie maligne
- Patologie psichiche, sindromi dolorose
- Diabete non compensato oppure altri tipi di patologie sistemiche non compensate
- Terapia con bifosfonati in caso o precedente
- Malattie del metabolismo osseo
- Tendenza emorragica, immunodeficienza
- Impianti dentali singoli con cattiva prognostica
- Allergie verso i componenti del sistema implantare
- Allergia al titanio
- Igiene orale inaccurata, compliance carente

Relative
- Diabete, brussismo, allergie, gravidanza
- Abuso di alcool e droghe, fumo
- Cisti preirradiate, terapia con anticoagulanti
- Patologie dell'articolazione temporomandibolare (d'altra parte, con una terapia impiantare,è possibile trattare anche patologie dell'articolazione temporomandibolare)
- Residui radicolari, parodontite
- Presenza di tessuto osseo ridotta; in modo particolare in dimensione verticale e/o in caso di pericolosa vicinanza a strutture compromesse (tra le altre, N. Mentalis, seno mascellare). Verificare sempre se esiste la possibilità di applicare un impianto basale (od es. il BOI) con un numero di rischi inferiore.

Interazioni
Sono state riportate in letteratura interazioni tra le superfici in titanio e i preparati per l'igiene orale contenenti fluoro. Informare il paziente a tale riguardo. Sulla base della differente rigidità degli impianti per via crestale e dei denti naturali, occorre considerare un'influso fortemente diverso sulla statichi, in caso di intenventi combinati. Numerosi sistemi protesici impiantari su impianti per via crestale, possono limitare la flessitive e la mobilità reciproca delle ossa del cranio. In tale contesto sono stati riportati stati dolorosi.

Applicazione
Diagnostica/Informazioni
La diagnostica consiste in: anamnesi, esame clinico, esame radiologico tramite radiografia miniaturizzata e ortopantogramma, uniti, talvolta a esame CT. Si consiglia di far eseguire un check-up clinico da parte di un esperto in medicina generale.
Gli impianti richiedono interventi elettivi, di cui è necessario fornire informazioni adeguate al paziente. È necessario indicare i trattamenti alternativi e le conseguenze degli impianti, unitamente alle conseguenze di un possibile esito negativo dell'intervento. In particolare, occorre anche accennare all'importanza di una corretta igiene orale e ai costi di un post-trattamento. Per quanto riguarda il tipo e l'entità delle informazioni da fornire, si rimanda alla giurisdizione specializzata.

Procedura
In anestesia locale, preferibilmente creando un lembo, viene ricavato un letto ossseo. Le aree osteolitiche ennosale. Esso è costituito da impianti, strumenti chirurgici e protesici e abutment. il sistema impiantare, è idoneo per interventi di impiantologia monofase o bifase.
Mantenere una distanza adeguata da strutture che potrebbero essere compromesse. Schemi dettagliati relativamente a questa aspetto sono reperibili nei nostri cataloghi prodotti completi.

Durante la preparazione della cavità ossea, occorre mantenere un raffreddamento intensivo del letto impiantare (ad es. con soluzione salina fisiologica (sterile) raffreddata).
Per la fresatura non superare mai la velocità di 500-800 giri/minuto. Utilizzare sempre punte affilate (massimo 10 applicazioni). Applicare la tecnica di fresatura/perforazione intermittente.
L'impianto viene estratto dalla confezione immediatamente prima dell'applicazione e inserito in modo stabile nel letto osseo. Deve essere obbligatoriamente raggiunta una perfetta stabilità primaria. Per fissare gli impianti a vite, servirsi di una chiave a cricchetto (RAT2), del torque-wrench (TW2) oppure di un cacciavite. Al fine di ridurre il calore da attrito, introdurre lentamente e senza esercitare una pressione eccessiva. A seconda del tessuto osseo presente e in base al progetto, gli impianti vengono inseriti con il collo (pilastro lucido) sporgente dall'osso, oppure completamente coperto dallo stesso. Se una protesi mobile viene sostenuta, durante la fase di cicatrizzazione attraverso un impianto coperto da mucosa, l'impianto dovrà essere inserito nell'osso, per evitare lo scoprimento durante la fase di cicatrizzazione e impedire la pressione masticatoria sull'impianto.
Per la scelta dell'impianto, occorre tenere in considerazione l'altezza e larghezza del tessuto osseo disponibile e valutarne la qualità. È consigliabile, in caso di tessuto osseo molle, non asportare una quantità eccessiva di tessuto durante la fresatura, bensì comprimere piuttosto l'osso spostandolo lateralmente per mezzo di un osteotomo.
Infine, l'impianto viene chiuso, nel talo della bocca, con una vite chirurgica (processo in due fasi), oppure viene applicata una vite di guarigione di lunghezza adeguata (altezza della mucosa) (processo monofase). Eventualmente, seguono una chiusura adeguata della ferita e un controllo radiografico.
Durante la fase di cicatrizzazione (a seconda della qualità del tessuto osseo si consigliano dai 3 ai 6 mesi), è necessario controllare, a intervalli regolari, il sito dell'operazione. In caso di guarigione incompleta della mucosa e/o di penetrazione prematura nella mucosa, si consiglia di sostituire la vite chirurgica con un cappuccio di guarigione. Laddove la staticità dell'intera struttura e la situazione durante l'inserzione lo consentano, è possibile procedere al carico dell'impianto immediatamente dopo l'inserzione. Tale decisione spetta al dentista curante. In caso di dubbio, osservare un tempo di guarigione senza carico di 3-5 mesi, a seconda della qualità del tessuto osseo presente. Al termine della fase di cicatrizzazione, viene eseguito un controllo clinico e radiologico.
Per il trattamento protesico sono disponibili abutment del sistema implantare. La tabella sottostante fornisce informazioni dettagliate per l'utilizzo dei pezzi corretti.
Per ulteriori informazioni si prega di utilizzare i relativi manuali d'istruzioni del sistema.

Avvertenza
- Dopo l'impianto, annotare per iscritto il tipo di impianto utilizzato e il numero di partita nella cartella clinica del paziente.
- Utilizzare gli impianti entro il periodo di scadenza indicato.
- Conservare gli impianti in un luogo asciutto e chiuso. Aprire la confezione solo al momento dell'applicazione. Evitare qualsiasi contatto con sostanze estranee prima dell'inserzione dell'impianto. Non maneggiare la parte ennosale dell'impianto.
- In caso di ingestione accidentale di impianti, abutment o accessori, accertarsi dei residui dell'oggetto (tramite radiografia o altro) e adottare misure mediche adeguate.
- La cicatrizzazione dell'impianto deve essere regolarmente controllata (ad es., radiologicamente).
- Al fine di evitare la perdita ossea, è necessario rimuovere tempestivamente impianti non osseointegrati o infetti. Il momento della rimozione dovrà essere stabilito dal dentista curante.

Durata/conservazione degli impianti
La durata degli impianti è di 5 o 7 anni dal momento della sterilizzazione; vedere data di scadenza sulla confezione.
Conservare il luogo ben chiuso e asciutto.

N.B.
Soltanto impianti chiusi nella confezione originale rimangono sterili per tutto il periodo di durata. Non si assume alcuna responsabilità per impianti risterilizzati dall'utilizzatore finale - indipendentemente dal metodo di sterilizzazione utilizzato. I prodotti sterili sono contrassegnati con il simbolo STERILE.
La data di scadenza viene indicata con il simbolo della clessidra. La scritta LOTTO indica il numero di partita. Utilizzare gli impianti una sola volta.

Dr. Ihde Dental si riserva il diritto di modificare il design dei prodotti e dei componenti o il loro confezionamento, di integrare le istruzioni per l'uso, ovvero concordarne nuovi prezzi e condizioni di fornitura. La responsabilità si limita alla sostituzione di prodotti difettosi. Si escludono ulteriori rivendicazioni di qualsivoglia natura.

Legenda dei simboli

	Leggere le istruzioni d'uso
	Data di scadenza
STERILE R	(Gamma) -sterilizzato
	Monouso
	non risterilizzare
STERILE	non sterili
LOT	Numero carico
	Conservare in luogo asciutto
	Tenere il recipiente ben chiuso
-5 °C - 35 °C	Conservare a temperatura compresa tra -5 °C e 35 °C
	Evitare l'uso del prodotto se la confezione non e' perfettamente integra
	Produttore

CE 0029

996-2TEILIG-03

Ultima revisione 2012-04

Un eventuale ritrattamento degli impianti comporta il rischio di infezioni in quanto non esistono procedimenti convalidati per il ritrattamento.

Per il ritrattamento degli strumenti rotanti risterilizzabili seguire le prescrizioni della direttiva RKI e della norma EN ISO 17664. Per ulteriori informazioni sui nostri strumenti consultare il relativo foglio di istruzioni tecniche allegato.
Il foglio di istruzioni tecniche è consultabile anche sulla pagina web www.implant.com

Dr. Ihde Dental AG
Dorfplatz 11
CH-8737 Gommiswald/SG
Tel. +41 (0)55 293 23 23
Fax +41 (0)55 290 23 00
contact@implant.com
www.implant.com

Instrucciones de uso
Por favor léalas atentamente

Sistema de implantes de dos piezas

Aviso
Para llevar a cabo tratamientos implantológicos es imprescindible conocer la bibliografía específica correspondiente. Es imprescindible tener experiencia quirúrgica en la evaluación del transcurso del tratamiento normal y patológico. La planificación protética debe ser realizada antes de la implantación – también cuando la situación quirúrgica requiera una modificación posterior de esa planificación. Estas instrucciones de uso no son en sí mismas suficientes para la aplicación inmediata del sistema de implantes.

Descripción
El sistema de implantes es un sistema para implantaciones odontológicas ennosales. Consta de implantes, instrumentos quirúrgicos y protéticos así como anclajes. El sistema de implantes es apto para procedimientos de implante monofásicos y bifásicos.

Componentes principales
Los materiales individuales los puede ver en la etiqueta del embalaje correspondiente o bien en el prospecto de la aplicación de sistema correspondiente.

Indicaciones
Con una oferta ósea adecuada en lo referente a la calidad ósea, el ancho y la altura del hueso:
- Restauraciones individuales para diastemas hasta el ancho de incisivos y premolares.
- Restauraciones de puentes en mandibulas y dentaduras dentadas, parcialmente dentadas y edéntulas
- Anclaje de prótesis a través de sistemas de anclaje con botón y arco
- Anclaje para sistemas de regulación ortodóntico

Efectos secundarios
Trastornos pasajeros
Dolores, sensación de tensión superficial, hinchazones, dificultades para hablar e inflamaciones de la encía.
Trastornos de larga duración
- Fístulas oroantrales y oronasales
- Infecciones localizadas o sistémicas
- Destrucción ósea en forma de cráteres a lo largo del período de uso
- En un procedimiento quirúrgico y protésico realizado correctamente - como en todos los demás implantes odontológicos- hay que contar también con pérdida ósea horizontal y vertical. No se puede predecir el tipo ni la cantidad de la pérdida ósea. Las pérdidas óseas funcionales y las inflamatorias pueden sumarse. Si los implantes se colocan cerca de estructuras especiales (nervio, seno maxilar, dientes contiguos...), puede ocasionarse un perjuicio reversible o irreversible (daño) de esas estructuras. Para proteger de infecciones es necesario plantearse realizar un tratamiento profiláctico con antibióticos. Se han descrito dolores crónicos relacionados con implantes dentales. Si no se alcanza la integración ósea hay que contar con que se produzca la exfoliación del implante.

Contraindicaciones
Absolutas
- Pacientes, cuyo estado sistémico no permite una implantación (para una comprensión de la bibliografía correspondiente para encontrar información detallada sobre esta amplia contraindicación)
- Antes, durante de o después de radioterapia y/o enfermedades malignas
- Trastornos psíquicos, síndromes de dolor
- Diabetes descompensada o cualquier otra enfermedad sistémica descompensada
- Terapias actuales o anteriores con bifosfonatos
- Enfermedades del metabolismo óseo
- Tendencia a sufrir hemorragias, inmunodeficiencia
- Implantes individuales de carga inmediata
- Alergias contra algún componente del sistema de implantes
- Alergia al titanio
- Mala higiene bucal, poca colaboración del paciente

- Relativas
- Diabetes, ruxismo, alergias, embarazo
- alcoholismo y drogodependencia, tabaquismo
- hueso irradiado anteriormente, terapias con anticoagulantes
- Enfermedades de la articulación mandibular (visto de otra manera, la terapia con implantes de la mandibula se pueden tratar con una terapia con implantes)
- Restos de raíces locales, periodontitis
- poca sustacia ósea: Sobre todo en vetical y/o cerca de estructuras en peligro (N. Metalis, seno maxilar...)

Siempre hay que comprobar si no se correría un riesgo menor con un implante basal (p.ej. BOI).

Interacciones
En la bibliografía se han descrito interacciones entre superficies de titanio y preparados de higiene bucal con fluoruro. Debe indicárselo al paciente. Debido a las diferentes rigideces de los implantes de cresta y de los dientes naturales hay que contar con una influencia estática muy distinta cuando se realicen trabajos combinados. Los sistemas de implantes protésicos en implantes de cresta pueden reducir la flexión y el movimiento de los huesos del cráneo una contra otra. Se han descrito estados de dolor relacionados con ello.

Aplicación
Diagnóstico/Explicación
El diagnóstico se compone de anamnesis, exploración clínica, exploración radiográfica con radiografías menores y ortopantomogramas así como TACs. Se recomienda que un médico de cabecera con experiencia lleve a cabo un examen médico. Los implantes son operaciones voluntarias sobre las que hay que informar al paciente exhaustivamente. Deben mostrarse los tratamientos alternativos y las consecuencia de las implantaciones así como los posibles fracasos. Sobre todo debe indicársele la importancia de una buena higiene bucal y los gastos de un tratamiento ulterior. Le remitimos a la jurisprudencia para el tipo y el volumen de las explicaciones.

Procedimiento
En anestesia local se crea un lecho de implante con instrumentos giratorios o expansores, preferiblemente mediante creación de lóbulos. Para la preparación de un lecho óseo adecuado se recomienda utilizar la fresa y seguir una secuencia de perforación:

Hay que mantener una distancia adicional con las estructuras en peligro. En nuestros prospectos encontrará esquemas detallados sobre ese aspecto.

Durante la preparación de la cavidad ósea debe comprobarse que el lecho del implante esté siempre refrigerado (p.ej. con solución de sal común fisiológica (estéril)).
No perforar nunca a más de 500-800 rpm. Utilizar siempre fresas afiladas (máx 10 aplicaciones). Emplear técnicas de fresado y perforación intermitentes.
El implante se extrae directamente antes de aplicar el paquete estéril y se inserta de modo estable en el lecho óseo. Es obligatorio alcanzar una buena estabilidad primaria. Los implantes de tornillo se atornillan con un trinquete (RAT2) , una llave inglesa (TW2) o un destornillador. Para minimizar el calor de fricción hay que apretar despacio y sin hacer presión. Según cuánta sustancia ósea haya y según la planificación prevista los implantes se insertan con el cuello (eje pulido) asomando por fuera del hueso o completamente escondidos en el hueso. Si se aplica una restauración provisional durante la fase de curación sobre el implante cubierto con mucosa, el implante debe estar insertado en el hueso para que no se ponga al descubierto durante esa fase por la presión de mordida.
Cuando seleccione el implante debe considerar el hueso existente con altura y anchura así como la calidad del hueso. Se recomienda no eliminar mucha hueso con las perforaciones al fresar, sino blandos, sino en su lugar comprimir el hueso apartándolo con osteotomas.
A continuación se cierra el implante o bien con el tornillo quirúrgico por el lado bucal (procedimiento de dos fases) , o se atornilla con el tornillo de cura con el largo adecuado (a la altura de la mucosa) (procedimiento de una fase). Si fuera necesario le cerraría la herida y se haría una radiografía de control. Durante la fase de cura (según qué calidad tenga el hueso se recomienda 3-6 meses) debe controlarse en la zona de la intervención con regularidad. Si la mucosa no sanase completamente y/o hubiese penetración de mucosa temprana se recomienda sustituir el tornillo de cura por una tapa de cura. En tanto como lo permitan la estática de la construcción total y la situación durante la inserción, los implantes también pueden cargar directamente después de la inserción. El dentista debe decidirlo. En caso de duda hay que cumplir un tiempo de curación sin carga de 3-5 meses -según la calidad ósea. Al finalizar la fase de cura se realizan un control clínico y radiológico.

Enemos pilares del sistema de implante a su disposición para el cuidado protésico. La tabla inferior le informa sobre los pilares correctos.
Información más detallada en el prospecto de la aplicación de sistema correspondiente.

Aviso:
Tras la implantación hay que fijar por escrito en la ficha del paciente el tipo del implante y el número de código.
Los implantes solo se deben utilizar durante el tiempo de durabilidad.
- Los implantes deben ser almacenados en un lugar seco, cerrados. El cierre se debe abrir inmediatamente antes de la aplicación. Debe evitarse cualquier contacto con sustancias ajenas antes de la inserción del implante. No se debe tocar la parte ennosal del implante.
- Si se tragasen implantes, pilares o accesorios accidentalmente hay que buscar dónde está el objeto (radiografía, etc) y tomar las medidas médicas necesarias.
- Hay que controlar con regularidad que el implante cure bien (p.ej. con radiografías).
- Para evitar la pérdida ósea hay que extraer a tiempo los implantes no oseointegrados o infectados. El dentista determina el momento de la extracción.

Caducidad/Almacenamiento de los implantes
La durabilidad es de 5 o 7 años a partir de la esterilización, vea fecha de caducidad en el embalaje.
Almacenar en un lugar seco bien cerrado

Anotación
Solamente los implantes cerrados permanecen estériles durante el período de durabilidad. Si el usuario volvió a esterilizar los implantes no garantizamos esa esterilización -independientemente del método. Los productos estériles tienen el símbolo ESTÉRIL. La fecha de caducidad se indica en el símbolo de reloj de arena. El dato LOT indica el número de código. Los implantes solo se pueden utilizar una vez.

Leyenda

	Lea las instrucciones de uso
	Fecha de caducidad
STERILE R	(Gamma) -esterilizado
	Utilicelo solo una vez
	No volver a esterilizar
	no estéril
STERILE	
LOT	Número de código
	Almacenar en un lugar seco
	Mantener correctamente cerrado
-5°C - 35°C	Temperatura de -5° C a 35 °C
	No utilizar si el embalaje está dañado
	Fabricante

CE 0029

996-2TEILIG-03

Última revisión 2012-04

En un nuevo procesamiento de los implantes se corre el riesgo de desarrollar infecciones, dado que no existen métodos validados para su tratamiento.

En el procesamiento de instrumentos rotatorios reesterilizables deben cumplirse las normas del Instituto Robert Koch y la Norma EN ISO 17664. Las directrices para el procesamiento de nuestros instrumentos están disponibles en la hoja informativa que acompaña a los instrumentos. Se puede acceder también a esta hoja informativa en la página web www. implant.com.

Dr. Ihde Dental AG
Dorfplatz 11
CH-8737 Gommiswald/SG
Tel. +41 (0)55 293 23 23
Fax +41 (0)55 290 23 00
contact@implant.com
www.implant.com

Инструкции за употреба
Моля, прочетете внимателно!

Двучастова имплантна система

Забележка
Познаването на широката специализирана литература е предпоставка за провеждането на имплантологичното лечение. Хирургичният опит в оценката на нормалното и патологичното развитие е задължителен. Протетичното планиране трябва да се извършва преди имплантирането, дори и да в възможно хирургичната ситуация да доведе до по-късно промяна в планирането. Тези инструкции сами по себе си не са достатъчни за незабавното използване на имплантната система.

Описание
Имплантната система е система за енносално дентално имплантиране. Тя се състои от импланти, хирургични и протезни инструменти, както и абатменти.
Имплантната система е подходяща за едноетапни и двуетапен метод на имплантиране.

Състави
Отделните активни субстанции могат да бъдат намерени на съответния етикет на опаковката или в брошурата относно използването на системата.

Индикации
При адекватен наличен костен материал, по отношение на качеството на костта, ширината на костта и височината на костта:
- Единични зъбни възстановявания за пространства до широчина на резците и премолярите
- Мостови конструкции в частично обеззъбени и изцяло обеззъбени челюсти
- Задържане на протези посредством мостови конструкции и системи със сферичен стават
- Задържане на ортодонтски регулиращи системи

Странични ефекти
Временен дискомфорт
Болка, чувство за напрежение, оток, трудности при говорене и възпаление на венчилата.
Дългосрочни смущения
- Ороантрална и орономазална фистула
- Локализирани или системни инфекции
- Костна дегенерация с форма на кратер по време на процеса на използване

Да се очаква хоризонтална и вертикална костна дегенерация и при правилна хирургична и протетична процедура. Не може да се предвиди вида и степента на костната загуба на костната маса е непредсказуема. Може да се окомплирира функционално причинена и възпалителна дегенерация на костите. Ако се поставят импланти в близост до определени структури (нерви, максиларен синус, съседни зъби и т.н.), това може да доведе до обратимо или необратимо увреждане на тези структури. Трябва да се вземе под внимание необходимостта от антибиотична профилактика за предотвратяването на инфекция. Хронична болка трябва да се докладва във връзка със зъбните имплантни. Ако не е настъпила осеинтеграция, трябва да се очаква ексфолиация на импланта.

Противопоказания
Абсолютни
- Пациенти, чието общо системно състояние не позволява имплантиране (за подробна оценка на това противопоказание, моля проучете съответната научна и техническа литература).
- Преди, по време и след лъчетерапия или при наличие на злокачествени процеси.
- Психологични разстройства, болкови синдроми.
- Некомпенсирани захарен диабет или други некомпенсирани системни синдроми.
- Текущи или минали терапии с бифосфонати.
- Нарушения в костния метаболизъм.
- Склонност към кървене, имунна недостатъчност.
- Индивидуално натоварени единични зъбни възстановявания.
- Алергия към компонентите на имплантната система.
- Алергия към титан.
- Неадекватна устна хигиена.

Относителни
- Диабет, бруксизъм, алергии, бременност
- Алкохолна и наркотична зависимост, тютюнопушене
- Кост с ренгтенотерапия, терапия с антикоагуланти
- Смущения в темпоромандибуларната става (от друга страна, с имплантна терапия в темпоромандибуларната става могат да бъдат лекувани с имплантна терапия)
- Остатъчни зъбни корени, пародонтит
- Ограничено наличие на кост: особено във вертикално измерение и / или в непосредствена близост до застрашени структури (напр. максиларен синус и др.).

Винаги трябва да се проучи дали базалният имплант (напр. BOI) представлява по-малък риск.

Взаимодействия
Взаимодействията между титанови повърхности и продукти за орална хигиена, съдържащи флуорид, са описани в литературата. Пациентът трябва да бъде информиран за това. Тъй като кръстовидните имплантни, базалните имплантни и естествените зъби имат различна степен на твърдост, възстановявания подкрепени от всякаква комбинация от няколко от тях, може да има много различни ефекти върху статичния баланс на системата. Широко протетично възстановяване с кръстовидни имплантни може да намали относителната флексия и мобилност на краниалните кости. Има съобщения за болка в този контекст.

Употреба
Диагностика и информация за пациента
Диагнозата се състои от анамнеза, клиничния преглед и рентгенологичното изследване с помощта на конвенционални дентални рентгенографии и ортопантомографии и ако е необходимо компютърна томография. Препоръчителното да има извършен пълен медицински преглед от опитен общопрактикуващ лекар. Имплантните процедури са обширни процедури, изискващи подробно обяснение на пациента. Пациентът трябва да бъде запознат с алтернативите за лечение и информиран за възможните последици от имплантологичното лечение, както и възможността за неуспех. По-специално, пациентът трябва да бъде информиран за важността на дългосрочната хигиена и за сложността на постоперативното лечение. Относно начина и степента на информиране на пациента, се консултирайте със съответната съдебна практика.

Подход
Под местна упойка, за предпочитане с ламбо, имплантното ложе се препарира с фотрици или известващи инструменти. За препариране на адекватно имплантно ложе с помощта на Genialplant дрилове и спазване последователността на изборване, се препоръчва:
Трябва да бъде спазено съответно допълнително разстояние до застрашени структури. За подробна схема относно този аспект се обърнете към нашите разработени продукти брошури.

По време на препарирането на костния кухитет трябва да се осигури достатъчно охлаждане на импланта (т.е. с охлаждащ (стерилен) физиологичен разтвор). Никога не изборвайте с повече от 500-800 rpm. Винаги използвайте остър дрил (макс. 10 апликирания). Използвайте интермитентна техника на изборване. Имплантът се извежда от стерилната опаковка непосредствено преди поставяне му в имплантното ложе. Това е задължително за постигането на една добра първична стабилност. Винтовите имплантати трябва да се поставят с помощта на тресчотка, динамометричен ключ или отвертка. За да се намали фрикционното затопляне, имплантът трябва да се завинтва бавно и без голям натиск. В зависимост от наличната кост и определеното планиране, шийката (полираната част) на импланта се поставя супрамукозно или се покрива изцяло от костта. Ако снемаемата протеза бъде носена върху имплантите, която са покрити с мукозна мембрана по време на оздравителната фаза, имплантът трябва да бъде поставен в костта, за да се избегне оголването по време на оздравителната фаза, както и да се предотврати дъвкателна натиск върху импланта.
При избора на имплант, трябва да се вземе под внимание височината и ширината, както и качеството на наличната кост. Препоръчва се, да не се отстранява прекомерно много костна кост по време на изборване,а по-скоро костта да се компресира странично с остеотоми. След това имплантът или се завинтва с покриващ винт (двуетапен метод), или се завива оздравителен винт (едноетапен метод) с адекватна дължина (височина лигавицата). Ако е необходимо, следва и рентгенологичен контрол. По време на оздравителната фаза (препоръчват се 3-6 месеца в зависимост от качеството на костта), редовно трябва да се проверява мястото на интервенцията. В случай на съмнение, трябва да бъде спазен оздравителен период без натоварване от 3-5 месеца, в зависимост от качеството на костта. След завършване на контакта костта се извършва рентгенологичен и клиничен контрол.
Абатменти на имплантната система Generiplant са на разположение за протетично лечение. За повече информация се консултирайте със съответната брошура за приложение на системата.

Забележки
- След имплантиране, въведете вида и серийния номер на използвания имплант в досието на пациента.
- Не използвайте имплант след срока на годност посочен на опаковката.
- Съхранявайте всички импланти затворени в техните опаковки на сухо място. Не отваряйте опаковката до момента непосредствено преди поставянето на импланта. Избягвайте всякакви контакти с външни субстанции преди и по време на поставянето на импланта. Не докосвайте ennosal част на имплантата.
- При инцидентно поглъщане на импланти, принадлежности или аксесоари от пациента, намерете засегнатия обект с подходящи средства (напр. рентгенография) и незабавно вземете нужните медицински мерки.
- Оздравителният процес трябва да бъде редовно проследяван (напр. рентгенологично).
- За да се избегне загубата на кост, имплантите които не са осеинтегрирани или са инфектирани трябва да бъдат отстранени своевременно. Времето за отстраняване на импланта се определя от стоматолога.

Съхранение/Срок на годност
Срокът на годност е 5 или 7 години от датата на стерилизация. Вижте срока на годност на опаковката. Съхранявайте здраво затворени на сухо място.

Коментари
Само имплантите в оригинални опаковки са стерилни по време на срока на годност. Производителят не носи отговорност, ако имплантите са стерилизирани от крайния потребител, независимо от метода на стерилизация. Стерилните продукти са маркирани със символа STERILE. Срокът на годност е маркиран със символа на пясъчен часовник. Символът LOT показва номера на партидата. Имплантите са строго предназначени само за еднократна употреба.

Dr. Ihde Dental си запазва правото да променя дизайна на своите продукти и компонентите или техните опаковки, да редактира инструкциите за употреба, както и да предоговаря цените или условията на доставка. Отговорността е ограничена до замяна на дефектния продукт. Рекламации от друг тип са изключени.

Легенда

	Прочетете инструкциите
	Срок на годност
STERILE R	Гама стерилизация
	Само за еднократна употреба
	Не ре-стерилизирайте
STERILE	не са стерилни
LOT	LOT номерр
	Съхранявайте на сухо място
-5°C - 35°C	Съхранявайте плътно затворен
	Съхранявайте плътно затворен
	Не използвайте, ако опаковката е повредена
	Производител

CE 0029

996-2TEILIG-03

Последно издание 2012-04

В случай, че имплантите бъдат обработени (почистени, ре-стерилизирани), е възможно да възникнат инфекции, защото не са налични валидирани процедури за обработка.

Когато се обработват ре-стерилизиращи се медицински изделия, провилото на наръчника RKI и Европейския стандарт EN ISO 17644 са релевантни и трябва да се спазват. Насочете за употреба на нашите инструменти са на разположение в придружаващата ги брошура.

Dr. Ihde Dental AG
Dorfplatz 11
CH-8737 Gommiswald/SG
Tel. +41 (0)55 293 23 23
Fax +41 (0)55 290 23 00
contact@implant.com
www.implant.com

使用说明
请仔细阅读

两部分的植入系统

提示
采用植入法施行治疗必须具备相关医学技术知识。同时必须具备对于普通病理治疗流程进行评估的外科经验。在植入手术前，必须制定好有关假牙植入的计划，即使随后的外科手术可能会对该计划进行修正。当需要立即使用 植入系统时，不能仅参考本使用说明就进行操作。

产品描述
植入系统是一种用于牙科骨内人工种植的植入系统。它由植入体，外科手术装置以及假牙装置以及基台组成。植入系统适用于单步及双步式植牙方法。

基本组件
您可以从相应的包装标签或者/以及系统使用手册中了解产品的构成材料。

适应症
根据齿槽相应部位的骨质，骨骼宽度及高度的现状：
- 用种植法进行单个牙齿空缺，但宽度不得超过门牙和前白齿。
- 可作为牙桥的替代结构，用于齿齐全，或部分牙齿缺失或者无牙的下颚及整副牙齿上
- 通过桥形接片及牙根系统对假牙进行固定
- 用于固定畸齿校正调节系统

副作用
暂时性的不适感：
疼痛，紧张感，肿胀，发音障碍以及牙龈发炎。
统较长时间的副作用：
- 口鼻附近出现瘘管
- 局部或系统性感染
- 使用期间出现牙槽骨的退化
- 以及在正常外科手术及植入手术中可能会发生的水平方向及垂直方向上的骨质 使用任何其他骨矿体都存在此危险，由于无法预测植牙对骨骼造成损伤的形式及程度，因此有可能会积累成为影响骨骼功能或没有必要的骨损伤。如果植入体靠近某些特殊的结构体（如神经，颌化，相邻牙齿等），则可能会造成这些部位可逆或不可逆的损伤（伤痛）。此外，为防止感染可能还需要服用抗生素。当植牙后还可能会出现习惯性疼痛。而如果植体不能最终与牙骨骼合则会发生脱落。

禁忌
绝对禁忌
- 由于整体身体状况而不能施行植牙手术的患者（请参阅相关学术文献以便深入了解"绝对禁忌症"）
- 接受放射治疗之前，期间及之后，以及/或者患有恶性肿瘤疾病
- 心理疾病，疼痛综合症
- 不能通过药物调节的糖尿病或其他不可调节的全身性疾病
- 正在或之前曾接受双膦酸盐治疗
- 骨质代谢类疾病
- 出血性疾病，免疫缺陷，
- 无法良好保留牙体的植入
- 对植入系统组件过敏
- 钛合金过敏
- 口腔保健不良，无法遵照规定程序指南

相对禁忌
- 糖尿病，磨牙症，过敏症，怀孕期间
- 酗酒及吸烟者，吸烟者
- 骨骼受到过辐射，接受抗凝血剂药物治疗
- 有颌骨关节疾病（另一方面，许多颌骨关节疾病可以通过植入疗法治疗）
- 有牙根残留，以及牙周炎疾病
- 警告单薄：垂直方向上以及/或者易受损结构包括（<锻孔等）附近。

因此一定要评估基底植入（如BOI）的风险是否更小。

相互作用
在文献中已经提到了关于钛合金表面与含氟类口腔清洁用品之间的相互作用。因此这里的告知主要是关于患者的。由于植入体及自然牙齿的不同硬度，在两者协同工作时会有不同的静力学干扰。构筑在植入体顶部的全面修复体，因此在结合时会有不同的静力学干扰。在此种情况下，患者会感到疼痛。

使用
诊断/讲解
诊断主要由病历描述，临床检查，小型片式的X光检查和三位全景体层摄影构成，如有需要还应进行CT-检查。因此我们建议由经验丰富的全科医生进行体检。
植牙是一种选择性手术，因此必须向患者进行充分的讲解。务必使其明了相关的替代疗法和植牙的效果，以及如果失败所引发的后果，特别要指出口腔保健的重要性以及后续治疗的费用。有关这种讲解的方式及范围必须符合相关的法律规定。

操作方法
局部麻醉后，先在凸缘下用可旋转或可移置的器械搭成种植床，为了建立合适的骨床，建议使用 钻头并且只使用同一系列的钻头：

注意与危险的结构体保持适当的距离。请同时参看本公司产品手册中的详细与正确以了解详情。

在牙骨上钻孔时，要注意充分的冷却（例如使用冷冻过的（经过无菌的）等盐水）
钻头转速绝对不要超出500-800 Upm的范围。而且必须保证钻头始终锋利（每个钻头最多可使用10次）
必须先行磨时，应采用磨损少的钻头。
植入体从无菌包装内取出后必须立刻使用，并在牙床上插牢。 且植入体必须具有良好的稳定性，然后使用棘轮扭矩（RAT2，转矩扳手（TW2）或者螺丝刀将螺纹型植入体旋入。为了尽量减少摩擦产生的热量，必须缓慢并不用过大的力量旋拧。 之后将带有预留（已抛光的柄部）的植入体插入牙骨中，并根据骨质当时的状况以及之前的手术计划决定是否让其穿过黏膜或完全插入到牙骨里。 在康复期内，一旦粘膜组织盖的植入体可以承载可移除式人工种植牙系，就必须将植入体插入牙骨中，以避免在康复期内种植体暴露以及承受咀嚼压力。
在选择植入体时，必须顾及到牙骨的现状，即高度和宽度以及牙质。因此我们建议，在软骨处不要因钻孔而损去太多的骨骼，否则会由于骨薄更容易发生对牙骨的排斥性侧压。
接下来，可以用外科螺钉在口腔内侧将植入体锁死（双步式），或者也可以打上合适长度（粘膜高度）的康复螺钉（单步式方法）。 如有需要还必须对伤口进行缝合并进行X光检查。在康复期间（根据骨质情况，一般建议为3-6个月）还要监测检查手术部位。
如果粘膜治疗以及/或者之前的粘膜

穿孔没有完全痊复，则建议用带帽的康复螺钉替换外科螺钉。植入期间，在整体结构的静力学以及状况允许的情况下，植入体也可以直接负载应力。这一点要由施行手术的牙医决定。如不确定的话，则要保持在3-5个月的康复期内不要使其受力－康复时间要根据当前的管理决定